

劇 動物用医薬品 要指示医薬品 指定医薬品

2価MD生ワクチン (HVT+SB-1) 1,000ドーズ

2価MD生ワクチン (H+S) 2000 2,000ドーズ

マレック病(マレック病ウイルス2型・七面鳥ヘルペスウイルス)凍結生ワクチン(シード)



# 2 価 MD 生ワクチン (HVT+SB-1) 2 価 MD 生ワクチン (H+S)2000

マレック病(マレック病ウイルス2型・七面鳥ヘルペスウイルス)凍結生ワクチン(シード)

## 成分

主剤：凍結ワクチン 1 アンプル 2mL 中

◆2 価 MD 生ワクチン (HVT+SB-1)・・・1000 ドーズ

鶏胚初代細胞培養七面鳥ヘルペスウイルス FC-126 株(シード)  $10^{6.0} \sim 7.0$ FFU 以下

鶏胚初代細胞培養非腫瘍原性マレック病ウイルス SB-1 株(シード)  $10^{6.0} \sim 7.0$ FFU 以下

◆2 価 MD 生ワクチン (H+S)2000・・・2,000 ドーズ

鶏胚初代細胞培養七面鳥ヘルペスウイルス FC-126 株(シード)  $10^{6.3} \sim 7.3$ FFU 以下

鶏胚初代細胞培養非腫瘍原性マレック病ウイルス SB-1 株(シード)  $10^{6.3} \sim 7.3$ FFU 以下

## 用法・用量

◆頸部皮下接種：凍結ワクチンを素早く融解後、別売りの溶解用液(品名：「マレック/バッグ」あるいは「マレック溶解用液-IZO」)で1羽分当たり0.2mLとなるように溶かし、0.2mLずつを1日齢鶏の頸部皮下に接種する。

◆発育鶏卵内接種：凍結ワクチンを素早く融解後、別売りの溶解用液(品名：「マレック/バッグ」あるいは「マレック溶解用液-IZO」)で1個あたり0.05mLとなるように溶かし、自動卵内接種機を用いて0.05mLずつを18～19日齢卵の気室上方中央部より卵内に接種する。

## 効果又は効能

マレック病の予防

## 安全のために

⚠ 本製品は要指示医薬品です。ご使用は獣医師の処方せん、または指示に従って下さい。

⚠ ご使用の際には、本製品の添付文書をよくお読みの上、用法・用量を守って正しくお使い下さい。

貯蔵方法 液体窒素容器内に  $-190^{\circ}\text{C}$ 以下で貯蔵する

有効期間 製造後3年間3か月

本剤に関するお問い合わせは下記までお願いします。