


本製剤は要指示医薬品です。獣医師等の処方箋・指示により使用して下さい。

# ボックスオン AE・Pox (液状)



**特長**



- AE ワクチンと鶏痘ワクチンを**同時に**接種が可能
- **翼膜穿刺**で1羽ずつ確実に接種が可能
- 溶解用液が不要の**液状ワクチン**で、作業の**省力化**

**製品概要**

## 【主剤】

液状ワクチン 1バイアル (10mL 1,000羽分) 中、  
鶏脳脊髄炎ウイルス #1143 株感染鶏胚乳剤  $10^{6.0}EID_{50}$  以上  
発育鶏卵培養弱毒鶏痘ウイルス Hudson 株  $10^{6.0}EID_{50}$  以上

## 【貯法と有効期間】

倉出し前：-20℃以下で1年9か月間  
倉出し後：2～8℃で9か月間

## 【用法用量】

10週齢以上の鶏の翼膜に添付の穿刺針を用いて1羽当たり1回 (0.01mL) 穿刺する。  
なお、穿刺針を添付しない場合がある。その場合には、ワクチン穿刺用接種器『リカ式ワクチガン』を用いて、1羽当たり1回 (0.01mL) 穿刺する。

## 【包装】


1バイアル (10 mL 1,000羽分)



# 特長 1

## 増体重への影響

28日齢鶏への接種における平均体重の推移



SPF 鶏 10羽 / 群 / 試験  
ワクチン接種日齢：28日齢で翼膜穿刺  
※用法用量は10週齢からの使用  
室内実験データ

◆非接種対照群と比較して、増体重においては差がなかった。


承認申請書データ

# 特長 2

## 安全性や有効性（干渉作用等）への影響


AE 単味ワクチンとの比較

室内実験データ



POX 単味ワクチンとの比較

室内実験データ



◆期間中どちらの試験においても臨床的な異常は認められなかった。

◆AE、POXともに、本製剤と各単味製剤とで安全性と有効性は同等であった。

◆AE ウイルスと POX ウイルスを組み合わせることによる相互の干渉作用はなく、安全性と有効性に問題はなかった。

承認申請書データ

(製造販売)

ワクチノーバ株式会社

〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目24番8号  
オリックス浜松町ビル4階

TEL : 03-6895-3710 FAX : 03-6895-3711

E-mail : contact@vaxxinoa.co.jp

https://www.vaxxinoa.co.jp

vaxxinoa  
veterinary prevention strategies

販売代理店