

本製剤は要指示医薬品です。獣医師等の処方箋・指示により使用して下さい。

従来の飲水投与の他に、**翼膜穿刺**を追加して

新登場

AE液状生ワクチン

製品概要

【主剤】

液状ワクチン 1バイアル (10mL 1,000羽分) 中、
鶏脳脊髄炎ウイルス#1143株感染鶏胚乳剤 $10^{6.0}EID_{50}$ 以上

【貯法と有効期間】

倉出し前：-20℃以下で2年3か月間

倉出し後：2～5℃で9か月間

【用法用量】

【飲水投与の場合】

10週齢以上の鶏に、日齢の飲水量に応じた適量の水にワクチンを溶解し、1羽当たり1羽分になるように飲水投与する

【翼膜穿刺の場合】

10週齢以上の鶏の翼膜に添付の穿刺針を用いるか、あるいはワクチン穿刺用接種器『リカ式ワクチガン』を用いて、1羽当たり1回(0.01mL)を穿刺する

【包装】


1バイアル (10 mL 1,000羽分)



特長 1

異なる投与経路で、免疫の発現と持続を比較

※室内実験データ
承認申請書データ




- 穿刺接種後21日目、28日目ともに100%抗体陽転し、免疫の発現時期は経口投与と差は無かった。
- 抗体は接種後20週まで100%持続しており、経口投与における持続と差はなかった。

特長 2

産卵中の攻撃試験

※社内 室内実験データ



- 攻撃試験においてもワクチン接種群は安定した産卵率を示した。
- 対して、攻撃対照群ではAEの典型事例とされる一過性の産卵率の低下 (V字型の産卵曲線) を示し、ワクチン接種群の防御能が確認された。

(製造販売)

ワクチノーバ株式会社

〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目24番8号
オリックス浜松町ビル4階

TEL: 03-6895-3710 FAX: 03-6895-3711

E-mail: contact@vaxxinoa.co.jp

https://www.vaxxinoa.co.jp

vaxxinoa
veterinary prevention strategies

販売代理店