


バックスオンMD(HVT+CVI)-N

マレック病(マレック病ウイルス1型・七面鳥ヘルペスウイルス)凍結生ワクチン(シード)



バックスオンMD(HVT+CVI)-N

マレック病(マレック病ウイルス1型・七面鳥ヘルペスウイルス)凍結生ワクチン(シード)

本製品は要指示医薬品です。獣医師等の処方箋・指示に従ってお使いください。

ご使用の際には本製品の添付文書をよくお読みください。

成分及び分量

凍結ワクチン 2mL 2,000羽分中

主剤

鶏胚初代細胞培養七面鳥ヘルペスウイルス FC126 株 (シード)

… $10^{6.3}$ FFU 以上 $10^{7.3}$ FFU 以下

鶏胚初代細胞培養弱毒マレック病ウイルス CVI988-N 株 (シード)

… $10^{6.3}$ FFU 以上 $10^{7.3}$ FFU 以下

用法及び用量

小分製品を素早く融解後、別売りの溶解用液（品名：「マレック / バッグ」あるいは「マレック溶解用液 -IZO」）で1羽分当たり0.2mLとなるように溶かし、0.2mLずつを1日齢鶏の頸部皮下に接種する。

効能又は効果

マレック病の予防

貯蔵方法

-190℃以下

有効期間

製造後3年間



液体窒素タンクについて・・・

※お願い

- ・ワクチン到着時、液体窒素の充填状況をご確認下さい。液体窒素が枯渇している場合は、弊社担当者にご連絡下さい。
- ・保管中は、タンク内の液体窒素の充填具合を定期的に確認し、必要に応じて液体窒素を補充して下さい。
- ・使用後の液体窒素タンクは速やかに弊社にご返送下さい。

※注意事項

- × 液体窒素タンクの蓋の密封→液体窒素は常に気化しており、密封すると内圧が高まり爆発する危険がありますので、密閉しないで下さい。
- × 液体窒素の気化ガスを吸入→保管や取り扱いは、乾燥した換気の良い場所で2人以上で行って下さい。取扱中に眠気、呼吸困難が起こった場合は、早急に新鮮な空気のある場所に移動して下さい。これらの症状が持続したり、意識を失ったりした場合は直ちに医師に診せて下さい。
- × 液体窒素タンク傾斜、転倒→液体窒素が皮膚に触れると凍傷を起こすことがあります。取り扱う際には革手袋やカバー付き長靴を着用して下さい。